

- [Laparoscopia nella diverticolosi](#)
- [Terapia chirurgica dei diverticoli](#)
- [Prevenzione dei diverticoli colici](#)

Sintomi della malattia diverticolare

I sintomi della malattia diverticolare sono legati principalmente alla comparsa di infiammazione dei diverticoli, che sono delle piccole tasche che si formano nella parete del colon. La parete sottile dei diverticoli li espone alla possibilità di perforazione; il contenuto pieno di germi dell'intestino si riversa all'esterno del diverticolo e crea una infiammazione batterica localizzata. Se la contaminazione è notevole si crea una vera e propria peritonite.

In generale la diverticolosi è poco o per nulla sintomatica; tuttavia le frequenti infiammazioni possono portare alla riduzione di calibro del colon e dare stipsi e dolore localizzato a livello dei quadranti sinistri dell'addome.

Altre volte si forma una erosione dei vasi arteriosi intorno al diverticolo e ciò porta ad una emorragia che può essere di varia entità, fino alla rettorragia imponente.

Riassumendo, i sintomi più frequenti sono:

- dolore più o meno accentuato
- febbre se è presente una perforazione del diverticolo
- stitichezza
- irregolarità dell'alvo
- sanguinamento rettale

Se i sintomi dolorosi sono importanti e compare febbre, è utile un consulto medico poichè si può essere instaurata una diverticolite. La diverticolite è l'infiammazione del diverticolo, potenzialmente rischiosa. La sede più frequente di diverticolite è il colon sinistro a livello del sigma. In tal caso il dolore compare al quadrante addominale inferiore sinistro e può irradiarsi a tutta la parte inferiore dell'addome, al di sopra del pube.

La presenza di diverticoli non comporta un intervento chirurgico, ma le complicazioni dei diverticoli (perforazione, infiammazione e sanguinamento importante, oppure una situazione di ostruzione) possono richiedere una soluzione chirurgica.

La terapia chirurgica necessita della asportazione della parte di intestino colpita maggiormente dai diverticoli. In genere i diverticoli sono più frequenti nella parte sinistra del colon, a livello del sigma. L'intervento chirurgico richiede la asportazione del segmento di intestino e la successiva unione delle due parti rimanenti. L'intervento può anche essere eseguito in laparoscopia se le condizioni locali e generali del paziente lo permettono.